

Tratamiento Ambulatorio del Niño con Enfermedad Renal

Dr. Florencio McCarthy Waith

Pediatra Nefrólogo

Hospital del Niño

Situación de La Nefrología Pediátrica en América Latina

- *Millón de habitantes/Pediatras Nefrólogos*
 - Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela
 - Menos de 1
 - Costa Rica, México, Paraguay, Brazil y República Dominicana
 - 1 - 2
 - Perú, Guatemala, Colombia y Bolivia
 - Más de 2

Pediatric Nephrology Around the World
Latin America

Pediatric Nephrology. Barrat. Avner. Harmon

Situación de La Nefrología Pediátrica en América Latina

- *Millón de habitantes/Pediatras Nefrólogos*
 - Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela **Panamá**
 - Menos de 1
 - Costa Rica, México, Paraguay, Brazil y República Dominicana
 - 1 - 2
 - Perú, Guatemala, Colombia y Bolivia
 - Más de 2


Pediatric Nephrology Around the World
Latin America

Pediatric Nephrology. Barrat. Avner. Harmon


Situación de la Nefrología Pediátrica en América Latina

- Problemas principales
 - Numérico
 - Cualitativo
 - Distribucional


Síndrome Nefrótico




Síndrome Nefrótico




Síndrome Nefrótico



Síndrome Nefrótico




Síndrome Nefrótico



Síndrome Nefrótico

No se puede establecer dx o tx
Descompensado
Complicado
Biopsia



Tratamiento

- Actividad física
 - En reposo disminuye la excreción de proteínas y los niveles de catecolaminas, aldosterona y antidiurética
 - No hay evidencia que influya en el curso de la enfermedad ni el pronóstico
 - Natación
 - No asistir a sitios concurridos
 - No limitar en remisión

Prednisona

- 60mg/m²/día sin exceder de 80mg por 4 semanas y luego 40mg/m²/día por 4 semanas
- 93% de respuesta
- 60mg/m²/día sin exceder de 80mg por 6 semanas y luego igual dosis en días alternos por 6 semanas
 - Menos recaídas en los primeros 7 meses

– Efectos adversos

- Crisis adrenal
- Edema
- Osteonecrosis
- Miopatía
- Enfermedad
úlcero péptica
- Hipokalemia
- Osteoporosis
- Euforia
- Sicosis
- Miastenia gravis
- Supresión del
crecimiento
- Infecciones
- Hipertensión
- Labilidad emocional
- Retención hidrica
- Sudoración nocturna
- Cataratas
- Seudotumor cerebri
- Diabetes
- Apetito voraz

- Remisión
 - Tira reactiva negativa por 3 días consecutivos o proteinuria menor a 4mg/m²/hora
- Recaída
 - Tira reactiva con 2+ por 3 días o 3 -4+ con edema
- Recaídas frecuentes
 - 2 recaídas en 6 meses
 - 4 recaídas en 1 año

- Corticosensible
 - Negativización de la proteinuria
- Corticodependiente
 - Aparición de 2 recaídas mientras se recibe tratamiento esteroideo o durante los 14 días después de suspendido
- Corticoresistente
 - Falta de respuesta terapéutica luego de esquema de 8 semanas de tratamiento

Frecuencia de las Consultas

- Cada 2 semanas en tratamiento inicial o recaídas
- Cada 3 meses durante la remisión

Vigilar

- Crecimiento y desarrollo normal
- Vacunas contra Neumococo, Influenza
- Función renal, urinálisis